

使用に当たって、この説明文書を必ず読むこと。
また、必要なときに読めるよう大切に保存すること。

第 3 類医薬品 外皮用殺菌消毒剤

エタノール消毒綿 80%A

【製品の特徴】

消毒用エタノールを医療脱脂綿に含浸させた個包装の消毒綿である。

【使用上の注意】

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分、アルコール製剤によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 患部が広範囲の人
- (3) 深い傷やひどいやけどの人

2. 次の部位には使用しないこと

- (1) 損傷のある皮膚
- (2) 目の周囲、粘膜など
- (3) 局所刺激作用があるため、軽く塗布するだけにとどめ、患部に貼付しないこと



相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人、薬や化粧品などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみなど)を起こしたことがある人
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

● その他の注意

本剤の使用により、アレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある。

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 外用にのみ使用すること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、直ぐに水又はぬるま湯でよく洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (5) 同一部位に反復使用した場合には、脱脂などによる皮膚荒れを起こすことがある。
- (6) 広範囲又は長時間使用する場合には、気化したアルコールの吸引に注意すること。

(7) アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療機器を消毒する際は血清、膿汁などを十分洗い落としてから使用すること。

(8) 医療機器の消毒を行う際は、消毒を行う医療機器の添付文書及び製造販売業者に確認の上、使用すること。

【成分・分量】

本品	100mL 中	
日本薬局方	エタノール	83mL
日本薬局方	精製水	適量
医療脱脂綿		19g

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光を避け、涼しい清潔な場所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 火気の近く及び静電気の影響の強い場所での使用・保管・廃棄に注意すること。
- (4) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (5) 綿に黒色又は黄色の斑点が見られる場合があるが、これは綿花の葉や種子の一部で、使用上の問題はない。
- (6) 再使用しないこと。
- (7) 開封後は速やかに使用すること。

【消費者相談窓口】

本品についてのお問い合わせ先

オオサキメディカル株式会社

お客様相談室 TEL：0120-15-0039

受付時間 10:00～17:00（土・日、祝日を除く）

【製造販売業者等の氏名又は名称及び住所】

製造販売元

スズラン株式会社

〒462-0023 愛知県名古屋市中区安井四丁目 1 番 29 号

販売元

オオサキメディカル株式会社

〒452-0812 愛知県名古屋市中区玉池町 203 番地